

# PLUS DE 12 MILLIONS DE PATIENTS EN AFFECTION LONGUE DURÉE EN FRANCE




## En chiffres :

| Code ALD | Libellé de l'ALD                                                                                     | Effectifs en 2022 | Âge moyen   | TCAM 2010-2022 | Part des effectifs |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|
| N.A.     | <b>Maladies cardio-neurovasculaires</b>                                                              | <b>4 168 300</b>  | <b>73</b>   | <b>1,40%</b>   | <b>28%</b>         |
| 8        | <b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>                                                        | <b>3 293 020</b>  | <b>67</b>   | <b>4,80%</b>   | <b>23%</b>         |
| 30       | <b>Tumeur maligne</b>                                                                                | <b>2 386 370</b>  | <b>69</b>   | <b>2,10%</b>   | <b>16%</b>         |
| 23       | <b>Affections psychiatriques de longue durée</b>                                                     | <b>1 526 110</b>  | <b>50</b>   | <b>3,40%</b>   | <b>11%</b>         |
| 9        | Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave                             | 416 160           | 50          | 5,40%          | 3%                 |
| 15       | Maladie d'Alzheimer et autres démences                                                               | 379 970           | 85          | 3,40%          | 3%                 |
| 14       | Insuffisance respiratoire chronique grave                                                            | 340 440           | 63          | 0,20%          | 2%                 |
| 22       | Polyarthrite rhumatoïde                                                                              | 258 890           | 65          | 3,10%          | 2%                 |
| 19       | Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique                                                 | 238 120           | 67          | <b>7,30%</b>   | 2%                 |
| 24       | Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives                                              | 223 940           | 49          | 5,50%          | 2%                 |
| 27       | Spondylarthrite ankylosante grave                                                                    | 202 850           | 54          | <b>8,90%</b>   | 1%                 |
| 6        | Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses                                                     | 173 790           | 60          | 0,30%          | 1%                 |
| 16       | Maladie de Parkinson                                                                                 | 148 720           | <b>76</b>   | 4,20%          | 1%                 |
| 21       | PAN, LEAD, sclérodermie généralisée                                                                  | 148 190           | 63          | <b>8,20%</b>   | 1%                 |
| 7        | Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH                                                   | 140 000           | 51          | 3,10%          | 1%                 |
| 25       | Sclérose en plaques                                                                                  | 109 370           | 52          | 4,10%          | 1%                 |
| N.A.     | Autres                                                                                               | 314 020           | 48          | 4,16%          | 2%                 |
| N.A.     | <b>Total patients en ALD liste (ALD 30) (un patient peut-être exonéré au titre de plusieurs ALD)</b> | <b>11 893 400</b> | <b>64</b>   | <b>2,70%</b>   | <b>N.A.</b>        |
| N.A.     | <b>Total patients en ALD hors-liste (ALD 31)</b>                                                     | <b>823 790</b>    | <b>54</b>   | <b>4,50%</b>   | <b>5,50%</b>       |
| N.A.     | <b>Total patients en ALD polypathologie (ALD 32)</b>                                                 | <b>73 980</b>     | <b>83</b>   | <b>0,80%</b>   | <b>0,50%</b>       |
| N.A.     | <b>Total patients en ALD (ALD 30-31-32) (un patient peut-être exonéré au titre de plusieurs ALD)</b> | <b>12 344 220</b> | <b>63</b>   | <b>2,70%</b>   | <b>N.A.</b>        |
| N.A.     | <b>Total des ALD reconnues (ALD 30-31-32)</b>                                                        | <b>15 366 030</b> | <b>N.A.</b> | <b>3,00%</b>   | <b>100%</b>        |

ALD = Affection Longue Durée. Un patient peut avoir plusieurs ALD

TCAM = Taux de croissance annuel moyen

## En graphique : CROISSANCE ANNUELLE DES ALD PAR RAPPORT À L'ÂGE MOYEN ENTRE 2010-2022



Le tableau prend en compte les ALD dont l'effectif est supérieur à 100 000

Abscisse : Âge moyen

Ordonnée : Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM)

### Sources :

Rapport IGF-IGAS, juin 2024, pages 9-10 : Données CNAM, prévalence des ALD. Périmètre : régime général uniquement (cf pour aller plus loin bas de page)

### Commentaires :

- Un marqueur majeur d'un système de santé solidaire
- Un défi majeur de prévention
- 1 Français sur 6 : plus 12 millions de personnes prises en charge
- Une croissance 10 fois supérieure à celle de la population française (4 % pour 0,3 %)
- 65 % des dépenses prises en charge par l'Assurance Maladie, pour 163 milliards d'euros
- 95 % d'ALD exonérantes
- Âge moyen : 61 ans
- Les 4 premières ALD représentent près de 80 % des effectifs

### Pour aller plus loin :

- IGF-IGAS : Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales. « Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - pour un dispositif plus efficient et équitable », (paru en juin 2024)